

Consignes implantologie BAx (version 02.02)

AVANT LE TRAITEMENT

- Informez nous de votre état de santé en remplissant le questionnaire en ligne.
- Si vous suivez un traitement, sans contre-indication ni consignes spécifiques de notre part, ni du spécialiste qui vous l'a prescrit, continuez-le normalement.
- Prenez avec vous votre dossier médical (rapports d'opération ou d'analyse, ordonnances etc...) si vous souffrez d'une maladie.
- Informez nous de tout changement de votre état dentaire

L'OPERATION

- Habillez-vous de manière décontractée avec un vêtement qui ne risque rien (Risque de tâches)

APRÈS LE TRAITEMENT

DOULEUR ET GÊNE :

Elle peut être présente sous forme d'une gêne, au niveau de la gencive blessée mais ne doit pas être intense ou lancinante. Les premiers jours, vous pouvez ressentir une gêne d'allocution. Votre langue doit retrouver sa place dans cette bouche neuve. Vous devez aussi réapprendre à manger.

Le retour à des sensations « normales » peut être plus ou moins long en fonction de chaque individu. De quelques heures à plusieurs semaines.

HYGIENE

N'utilisez plus de Bétadine dès la fixation des prothèses qui a un effet colorant. Vous pouvez utiliser le bain de bouche CURASEPT 212 pendant 1 semaine après le traitement. A partir du 15^{ème} jour, vous pourrez utiliser n'importe quel bain de bouche en vente en pharmacie (Colgate, Listerine...)

BROSSAGE ET DOUCHE ORALE

Réalisé sans dentifrice avec une brosse ultra souple. Le dentifrice à un pouvoir abrasif et peut diminuer la durée de vie de votre prothèse.

(A partir de la 3^{ème} semaine) Utilisez une douche orale de type Oral B qui permet, de nettoyer entre le bridge et la gencive.

CE QU'IL FAUT MANGER

2 heures après la fixation, vous pouvez manger normalement. Faites attention de ne pas tirer les aliments avec vos incisives ou déchirer des emballages.

Ne pas manger en tirant les aliments et en exerçant une contrainte inversée (tirant sur les dents). Ne déchirer pas les emballages avec vos dents.

VISITES DE CONTRÔLE

La première à lieu 3 mois après le traitement, elle est obligatoire car importante. Elle permet de contrôler les points de contact voir de les corriger si nécessaire. La suivante à lieu après 1 ans. Lors de ces visites, un polissage des dents permettra de leur redonner tout leur éclat si besoin.

EN CAS DE SOINS CHEZ UN AUTRE DENTISTE

Même si les soins ont lieu sur la mâchoire opposée qui n'a pas reçu d'implant, vous devez revenir pour un contrôle et d'éventuels réglages.

EN CAS D'URGENCE

Il convient de nous appeler immédiatement. Ne tardez pas, un problème même bénin peut s'aggraver s'il n'est pas traité à temps.

+33 (0) 988 999 932 org@anveli.org

Des petites infections peuvent apparaître le premier mois. Elles sont essentiellement dues aux extractions. Ce n'est pas grave mais il convient de la stopper à temps pour éviter une propagation aux implants. Dans ce, dans la plupart des cas, la prise d'antibiotiques suffit.

« La réussite d'un traitement en implantologie basale repose à 30% sur le matériel utilisé, 30% sur les actes du chirurgien et 40% sur le respect des consignes post opératoires par le patient »

PENDANT LE TRAITEMENT

LE SAIGNEMENT

-Le saignement est normal après l'opération, il permet de nettoyer les plaies.

-Eviter de rincer et de cracher de manière agressive, cela empêche la cicatrisation.

-Vous pouvez saigner du nez les premiers jours, ne vous mouchez pas

-Dormez avec deux oreillers sous la tête la première nuit.

-Un hématome et/ou un œdème peuvent apparaître sur la joue ou du cou. Fréquent et sans gravité, ils sont principalement dus aux extractions.

LES BAINS DE BOUCHE

Vous réaliserez un bain de bouche avec de la Bétadine fournie par l'équipe médicale. Vous le coupez à l'eau :
1 volume d'eau /1 volume de Bétadine

LES FILS DE SUTURE

Les sutures sont retirées juste avant la fixation de bridge.

CE QU'IL FAUT MANGER

Mangez en évitant les aliments et les boissons chaudes durant les 2-3 jours qui suivent l'intervention. Eviter les yaourts et privilégiez les soupes. Sur places, des repas à domicile sont possibles.